

USO DE LA NALOXONA ANTE UNA SOBREDOSIS DE DROGAS

Debe administrarse Naloxona a cualquier persona que haya tomado drogas y que pudiera estar sufriendo una sobredosis. Una sobredosis puede provocar paros respiratorios o una respiración lenta y dificultosa. ¡Actúe rápido! Una sobredosis puede ser fatal.

Administre Naloxona incluso aunque desconozca el tipo de droga que tomó la persona. La Naloxona solo tendrá efecto sobre los opioides; no es perjudicial si se tomó otro tipo de fármaco.

1. BUSQUE UNA RESPUESTA

- Intente despertar a la persona. Sacúdala y grítele el nombre.
- Frote sus nudillos fuertes sobre el centro del pecho.
- Mantenga una oreja cerca de la nariz de la persona para escuchar o sentir signos de respiración.
- Obsérvele los labios y las uñas; si muestran un color pálido, azulado o gris, es signo de una sobredosis.

2. LLAME AL 9-1-1

- Infórmele al operador su ubicación exacta.
- Cuéntele que está con una persona que no respira. No es necesario que mencione nada sobre las drogas o medicamentos que observe en el lugar.
- Infórmele al operador que le administrará Naloxona a la persona.
- Siga las instrucciones que le indique el operador.

3. ADMINISTRE NALOXONA

- Hay dos tipos comunes de Naloxona. Siga las instrucciones que se indican a la derecha ("Cómo administrar Naloxona").

4. COMIENCE A DAR RESPIRACIÓN BOCA A BOCA

- La persona que está sufriendo una sobredosis necesita oxígeno. La Naloxona puede demorar unos minutos en hacer efecto. Compruebe nuevamente si la persona respira.
- Siga las instrucciones del operador del 9-1-1 hasta que llegue la ayuda.

5. ADMINISTRE UNA SEGUNDA DOSIS DE NALOXONA

- Espere unos 3 minutos hasta que la Naloxona haga efecto. *Si la persona no responde una vez transcurridos los 3 minutos, administre una segunda dosis.*

6. ASISTENCIA POSTERIOR A UNA SOBREDOSIS

- Permanezca con la persona hasta que llegue la ayuda. Recuerde que las leyes del buen samaritano ofrecen protección cuando llama al 9-1-1 por una sobredosis.

- Si la persona comienza a respirar sola, pero no despierta, ubíquela de costado en una posición de recuperación.
- Cuando la persona despierte, puede presentar síntomas de abstinencia de opioides, tales como escalofríos, náuseas y dolores musculares.
- Es posible que no recuerde lo que sucedió. Puede tener miedo o mostrarse nerviosa o inquieta. Tranquilícela hasta que llegue la ayuda.

CÓMO ADMINISTRAR NALOXONA

ATOMIZADOR NASAL:

No requiere armado. **No pruebe el dispositivo.** Cada dispositivo funciona solamente una vez. Puede que necesite ambos dispositivos.

- 1 Despegue el papel** del paquete para quitar el dispositivo.
- 2 Sostenga** la punta del atomizador sobre cualquiera de los orificios nasales.
- 3 Presione** el émbolo con firmeza para inyectar la dosis en la nariz.

Clasificación	Medicamentos /Opioides
OPIOIDES RECETADOS	
Analgésicos	Morfina, Oxycodona (OxyContin, Percocet), Hidrocodona (Vicodin, Norco), Codeína, Tramadol
Tratamiento del dolor severo	Fentanilo (Duragesic, Actiq)
OPIOIDES NO RECETADOS (USO ILEGAL)	
Producción ilegal	Heroína